

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE DE LA BIBLIOTHEQUE

58 rue du Chevaleret
75013 PARIS
Tel : 01 44 24 40 40
Fax: 01 44 24 40 41



Horaires d'ouverture
Lundi au vendredi de 7h à 18h
Samedi de 8h à 13h

www.labodelabibliotheque.fr

(RER) (C) (M) 14 Bibliothèque François Mitterrand




Vous disposez de 2 heures pour nous amener le prélèvement si vous effectuez celui-ci a domicile ou si celui-ci est réalisé par votre médecin ou un infirmier

NOM..... PRENOM.....date de naissance :.....



Questionnaire :

Quel est le site de prélèvement ?	
A quelle heure a été réalisé le prélèvement ?	
Avez-vous des symptômes (douleur, rougeur, écoulement...):	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Existe-t-il des vésicules sur la peau lésée ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Décrivez vos symptômes :	
Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes ?	
avez-vous pris des antibiotiques il y a moins de 4 jours ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
avez-vous appliqué un traitement local il y a moins de 4 jours ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Si oui quel est le nom de ce traitement ?	

AVEC LE TUBE ET LE COTON TIGE



AVEC L'ECOUVILLON



Rappel : ne pas toucher le bout cotonneux, ne pas le laisser tomber
Si nécessaire fourniture d'un autre écouvillon

2 écouvillons sont nécessaires.

Le premier, un écouvillon blanc simple à remettre dans son manchon.

Le second, un écouvillon à remettre et à casser dans un petit tube bouché contenant un liquide que le laboratoire remet en même temps.

Rappel : ne pas toucher le bout cotonneux, ne pas le laisser tomber

Si nécessaire fourniture d'un autre écouvillon

PRELEVEMENT URETRAL

- Introduction de la partie coton dans l'orifice urétral sur environ 1cm (toute la partie cotonneuse)
- Faire tourner le coton tige sur les parois de l'orifice en récupérant les sécrétions et les cellules superficielles
- S'il y a un écoulement il sera également récupéré sur l'écouvillon
- la même procédure doit être réalisée avec les 2 écouvillons

PRELEVEMENT AU NIVEAU DU PENIS, GLAND, PREPUCE

- Prélèvement avec le coton tige au niveau de la surface du gland du pénis (et non de l'intérieur de l'urètre)
- Si nécessaire, soulever les plis de peau pour pouvoir atteindre les zones malades avec le coton tige et frotter à plusieurs reprises sur les zones atteintes pour récupérer des sécrétions et des cellules superficielles.
- S'il existe un écoulement ou une lésion purulente, récupérer le liquide sur le coton tige.
- S'il existe des vésicules fermées, rompre la vésicule, gratter le fond et récupérer le liquide et des cellules superficielles sur le coton tige.
- Signaler l'existence de vésicules (cloques).

PRELEVEMENT DE PEAU

- Prélèvement avec le coton tige au niveau de la surface de peau concernée
- Si nécessaire, soulever les plis de peau pour pouvoir atteindre les zones malades avec le coton tige et frotter à plusieurs reprises sur les zones atteintes pour récupérer des sécrétions et des cellules superficielles.
- S'il existe un écoulement ou une lésion purulente, récupérer le liquide sur le coton tige.
- S'il existe des vésicules fermées (cloques), rompre la vésicule, gratter le fond et récupérer le liquide et des cellules superficielles sur le coton tige.
- Signaler l'existence de vésicules (cloques).

PRELEVEMENT DE GORGE

- Insérer délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec les amygdales et le fond de la gorge
- frotter 3 ou 4 fois, puis retirez l'écouvillon sans toucher l'intérieur des joues, ni de la langue.

PRELEVEMENT DE LANGUE

- Insérer délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec la langue
- frotter 3 ou 4 fois, puis retirez l'écouvillon sans toucher l'intérieur des joues.